

---

---

# سرطان دهانه رحم

---

---

گروه انکولوژی زنان

مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)

۱۳۸۷

آیا می دانید سرطان دهانه رحم همچنان یک علت عمده مرگ ناشی از سرطان ها در زنان کشور می باشد.

چه عواملی در ایجاد سرطان دهانه رحم دخیل می باشد؟

۱- عدم انجام آزمایشی به نام پاپ اسمیر. پاپ اسمیر یک آزمایش ساده و ارزان قیمت است که بر روی سلول های برداشته از دهانه رحم زنان انجام می شود. هر زنی بایستی بعد از ازدواج تا آخر عمر این آزمایش را انجام دهد. توصیه می شود هر زن انجام آزمایش پاپ اسمیر را در عرض ۳ سال اول ازدواج شروع کند و بایستی تا ۳۰ سالگی هر سال و سپس هر ۲ سال تا آخر عمر تکرار شود.

• اگر در دوران زندگی خود آزمایش پاپ اسمیر را انجام ندهید خطر سرطان دهانه رحم را ۲ تا ۶ برابر زیاد کرده اید.

• اگر یک پاپ اسمیر طبیعی داشته باشید خطر سرطان دهانه رحم را در خود تا ۴۵٪ کاهش داده اید.

• اگر در طول عمر خود ۹ آزمایش پاپ اسمیر طبیعی داشته باشید تا ۹۹٪ مبتلا به سرطان دهانه رحم نخواهید شد.

۲- مصرف سیگار توسط خود و حتی همسر خطر سرطان دهانه رحم را در شما دو برابر می کند.

۳- استفاده از قرص های ضد حاملگی به مدت بیش از ۵ سال خطر را میافزاید.

۴- ابتلا به بعضی بیماریها که ایمنی بدن شما را کاهش می دهد از قبیل بیماری ایدز یا انجام پیوند کلیه که مجبور به مصرف تعدادی از داروها هستید.

۵- اگر مقاربت شما از سن زیر ۱۶ سالگی شروع شده باشد خطر سرطان دهانه رحم در شما دو برابر خواهد شد.

۶- وجود هر گونه رابطه نامشروع جنسی با مردان دیگر موجب انتقال تعدادی از بیماریهای عفونی آمیزشی می شود از قبیل: زگیل تناسلی، ایدز و غیره که همگی منجر به سرطان دهانه رحم می شوند.

۷- اگر تعداد زایمان های شما زیاد باشد خطر سرطان دهانه رحم بالا می رود.  
۸- اگر همسر شما رابطه نامشروع جنسی با زنان دیگر ناسالم و یا زنی که مبتلا به سرطان دهانه رحم می باشد داشته باشد خطر سرطان دهانه رحم در شما هم بالا می رود.