

---

---

روشهای تشخیص ، درمان  
و پیگیریهای بعدی در  
سرطان دهانه رحم

---

---

گروه انکولوژی زنان  
مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)  
۱۳۸۷

در صورت داشتن آزمایش پاپ اسمیر غیر طبیعی یا داشتن خونریزی یا لک بینی غیر طبیعی به دنبال مقاربت جنسی یا داشتن ترشحات غیر طبیعی که به درمان مقاوم می باشند بایستی توسط متخصص زنان معاینه و با دستگاه کولپوسکوپ، کولپوسکوپی شوید.

### کولپوسکوپ چیست؟

دستگاهی است که دهانه رحم شما را بزرگتر می کند تا پزشک بتواند از قسمت‌های غیر طبیعی و مشکوک روی آن نمونه برداری کند. اگر جواب نمونه برداری شما، سرطان دهانه رحم گزارش شود بایستی جهت شروع درمان مرحله بیماری شما تعیین شود.

### برای تعیین مرحله بیماری لازم است اقدامات زیر انجام شود:

۱- بایستی زیر بیهوشی عمومی معاینه شوید تا مشخص شود که آیا بیماری از دهانه رحم به بافت‌های مجاور انتشار یافته است یا نه؟

۲- انجام آزمایشات خون

۳- عکس سینه و سایر بررسی‌های تصویری دیگر مثل سونوگرافی، CT اسکن و ... جهت تعیین انتشار تومور به جاهای دیگر بدن.

با انجام موارد فوق مرحله کلینیکی بیماری شما تعیین می شود. در کل ۴ مرحله وجود دارد.

### روشهای درمان:

دو روش وجود دارد:

۱- رادیوتراپی

۲- جراحی

هر دو روش اثر یکسان دارند ولی انتخاب هر کدام از آنها بستگی به مرحله بیماری، سن و وضعیت جسمانی شما دارد. هر چه مرحله بیماری پایین باشد (مرحله ۱ و ۲)، جراحی روش خوبی است. اگر بیماری در مراحل پیشرفته باشد (مرحله ۳ و ۴)، جراحی دیگر امکان پذیر نخواهد بود و بایستی رادیوتراپی انجام شود.

### رادیوتراپی به دو صورت انجام می شود:

۱- رادیوتراپی خارجی (در این روش اشعه از خارج به لگن و شکم شما تابانده می شود).

۲- رادیوتراپی داخلی (در این روش اشعه از داخل مستقیماً به دهانه رحم تابانده می شود).

در بعضی موارد پزشک جراح شما صلاح می داند که بعد از جراحی، رادیوتراپی خارجی یا داخلی انجام بگیرد.

### جراحی:

شامل برداشتن تمام رحم و دهانه رحم و قسمتی از واژن و غدد لنفاوی لگنی می باشد که به طور متوسط ۴ ساعت طول می کشد.

### پیگیری بعد از درمان:

بایستی بعد از درمان چه جراحی چه رادیوتراپی تا آخر عمر تحت کنترل پزشک متخصص زنان خود باشید. ابتدا هر سه ماه تا ۲ سال اول و سپس هر ۶ ماه تا ۵ سال اول و سپس هر سال تا آخر عمر.

در هر بار مراجعه بایستی معاینه شده و پاپ اسمیر انجام شود و به صلاحدید پزشک معالج عکس سینه و آزمایشات خون، سونوگرافی یا CT اسکن انجام شود.